



Assessorato Agricoltura

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. Ufficio Centrale Fitosanitario - U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Caserta

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI CAPUA

(Comuni di Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Canello Arnone, Capua, Castel Volturno, Giano Vetusto, Grazzanise, Pastorano, Pignataro Maggiore, S. Maria La Fossa, S. Tammaro, Vitulazio, Santa Maria Capua Vetere, San Prisco e Curti)

Publicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture

N° 13 del 19 Maggio 2021

Il Bollettino Fitosanitario Zonale svolge la funzione di notiziario di riferimento per segnalare problematiche fitosanitarie insorgenti e le novità legislative in materia di prodotti fitosanitari.

Andamento meteorologico

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito
http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2021.html

GIORNO	Vitulazio 23 Ist_ Temperatura aria (MED MAX CALC) °C	Vitulazio 23 Ist_ Temperatura aria (MED MIN CALC) °C	Vitulazio 23 Ist_ Temperatura aria (MED) °C	Vitulazio 23 Ist_ Umidità aria (MED MAX CALC) %	Vitulazio 23 Ist_ Umidità aria (MED MIN CALC) %	Vitulazio 23 Ist_ Umidità aria (MED) %	Vitulazio 23 Millimetri di pioggia (MED MAX CALC) mm	Vitulazio 23 Millimetri di pioggia (MED MIN CALC) mm	Vitulazio 23 Millimetri di pioggia (MED) mm
10/05/2021	27,7	10,9	18,9	95	38	70	0	0	0
11/05/2021	27,4	12,1	18,9	92	43	72	0	0	0
12/05/2021	21	11,8	16,6	99	57	79	2,2	0	5
13/05/2021	21,1	12,7	16,5	96	56	80	0,4	0	2
14/05/2021	20,9	7,7	15,3	99	46	77	4,6	0	12,8
15/05/2021	20,9	9,1	15,4	100	59	82	0,8	0	2,4
16/05/2021	23,3	11,1	16,8	99	58	80	0	0	0

GIORNO	Pignataro Maggiore 44 Ist_ Temperatura aria (MED MAX CALC) °C	Pignataro Maggiore 44 Ist_ Temperatura aria (MED MIN CALC) °C	Pignataro Maggiore 44 Ist_ Temperatura aria (MED) °C	Pignataro Maggiore 44 Ist_ Umidità aria (MED MAX CALC) %	Pignataro Maggiore 44 Ist_ Umidità aria (MED MIN CALC) %	Pignataro Maggiore 44 Ist_ Umidità aria (MED) %	Pignataro Maggiore 44 Millimetri di pioggia (MED MAX CALC) mm	Pignataro Maggiore 44 Millimetri di pioggia (MED MIN CALC) mm	Pignataro Maggiore 44 Millimetri di pioggia (MED) mm
10/05/2021	27,5	9,4	18,3	100	37	74	0	0	0
11/05/2021	27,1	10,2	18,1	98	41	77	0,2	0	0,2
12/05/2021	20,9	11,5	16,1	100	58	83	0,6	0	1,6
13/05/2021	21,9	11,8	16,1	100	55	84	1,6	0	3,6
14/05/2021	21,5	7,9	15	100	47	80	2,8	0	10,4
15/05/2021	21,1	8	15,1	100	61	86	0,6	0	1,4
16/05/2021	22,6	11,1	16,6	100	59	85	0	0	0

Stato fitosanitario delle colture

PESCO						
N°	Comune	UTM	Azienda	Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località				
01	Pignataro Maggiore	Località Areanova	Cimmino Antonio	Big Bang	Frutto Noce	Assenza di catture di <i>Cydia</i> ed <i>Anarsia</i> - Stato fitosanitario buono.



CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Cancro dei rametti (*Fusicoccum amygdali*)

Seccume rameale (*Cytospora cincta*, *C. leucostoma*)

Agronomico: Asportare e bruciare i rami colpiti. Effettuare concimazioni azotate equilibrate. Preferire le irrigazioni sotto chioma. Diisinfettare i grossi tagli di potatura. Proteggere adeguatamente i punti di innesto. Sistemare accuratamente il terreno. Scegliere varietà poco suscettibili. **Chimico:** Intervenire solo in caso di accertata presenza delle malattie: 1) Nella fase di bottoni rosa o scamiciatura. 2) Intervenire ad inizio-metà caduta foglie, in concomitanza di periodi umidi e piovosi.

Marciume radicale (*Armillariella mellea*)

Agronomico: Assicurare un accurato sgrondo delle acque dal suolo ed evitare per quanto possibile ferite all'apparato radicale. Bolla o accartocciamento fogliare (*Taphrina deformans*) 2 **Chimico:** Nei pescheti con un basso livello di rischio di infezione, un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie ed un secondo a fine inverno o posticipato nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa.

***Cydia orientale* del pesco (*Cydia molesta*)**

Anarsia (*Anarsia lineatella*)

Controllo biologico:

Confusione o disorientamento sessuale all'inizio dei voli.

Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima generazione. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali, in particolare su quella di provenienza dei venti dominanti, in modo da interessare l'intero frutteto con la nube feromonica.

Installare le trappole a feromoni a fine fioritura nel caso si intendano utilizzare gli IGR.

Campionamenti: su 100 germogli/ha e/o 100 frutti/ha scelti a caso sul 5-10% delle piante, dopo le prime catture degli adulti o, in assenza di trappole, al verificarsi dei primi attacchi.

Controllo chimico:

Intervenire con gli IGR quando si ha un sensibile incremento nelle catture degli adulti.

Se si impiegano i fosfororganici attenersi alle seguenti soglie:

Soglia di intervento: 3% di infestazione attiva per l'Anarsia, calcolata applicando la seguente formula: soglia di Intervento = (% di germogli infestati/3 + % di frutti infestati)/2. Per la Cidia la soglia di intervento è di 1-2% di germogli e/o frutti infestati.

Ragnetto rosso dei fruttiferi:

campionamento: esaminare 100 foglie 2- 5 foglie per venti o cinquanta piante. Lotta chimica Soglia di intervento: 60% di foglie occupate da forme mobili e con meno del 20% di foglie con acari predatori (Fitoseidi).

MELO

N°	Comune	UTM	Azienda	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località				
01	Pastorano	Limata	Di Rosa Giuseppe	Annurca	Frutto noce	Stato fitosanitario buono, non vi sono, al momento, problemi da segnalare. Nessuna cattura.

Cancri rameali (*Nectria galligena*, *Diaporthe perniciosa*, *Botryosphaeria obtusa*)

Agronomico: Asportare eventuali rami colpiti e bruciarli. Ripulire le superfici di taglio e trattarle con un mastice cicatrizzante, addizionato con sali di rame. Chimico: Solo negli impianti già colpiti o fortemente danneggiati da grandine, intervenire alla caduta del 30-40% delle foglie e poi alla loro completa caduta e, eventualmente, in primavera, all'ingrossamento delle gemme.

Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*)

Agronomico: Adottare portainnesti tolleranti. Evitare ferite al colletto. Assicurare il drenaggio delle acque in eccesso. Chimico: Intervenire in modo localizzato sulle piante colpite

Fillominatori (*Cemistoma*, *Litocollete*):

Installare e trappole a ferormoni se si prevede di impiegare gli IGR; Campionamento: controllare la pagina inferiore di circa 300 foglie/ha prelevate a caso su circa il 5 -10% delle piante Lotta chimica: • per il *Cemistoma* la soglia è pari al 50% di foglie con uova o mine iniziali ed al 30% con mine più grandi; • per il *Litocollete* la soglia sale al 75% di foglie con uova o mine iniziali ed al 50% di foglie con mie di maggior diametro. NOCE U

Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*) Rodilegno rosso (*Cossus cossus*)

Cattura massale con 10 masstrap a ettaro. Oppure chimico alla schiusura delle uova utilizzando i prodotti previsti dal disciplinare. In caso di attacchi circoscritti su poche piante si può utilizzare la tecnica del ferretto uccidendo la larva nella galleria manualmente appunto con un ferretto oppure tagliando il ramo infestato e bruciarlo.

Ticchiolatura (f. a. *Venturia inaequalis*; f.c. *Spilocea pomi*)

Nella fase di "punte verdi", in alternativa ai prodotti rameici, si possono usare i polisolfuri, che hanno anche efficacia anticoccidica. Gli interventi pre-fiorali, necessari in caso di andamento meteorologico piovoso, vanno effettuati con prodotti di copertura. Utilizzare i fungicidi

endoterapici dalla fioritura fino a “frutto noce”, dopo ogni pioggia infettante e tenendo conto della persistenza del prodotto utilizzato.

Nella fase di ingrossamento frutti trattare solo se la malattia è presente in campo, utilizzando prodotti di copertura e sospendendo i interventi in piena estate se le temperature sono elevate. Sulle foglie cadute effettuare un intervento con urea agricola

KIWI

N°	Comune	UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
01	Pastorano	Limata	De Rosa Angelina	Haward	Bottoni fiorali	Non si evidenziano problemi fitosanitari.



Bottoni fiorali

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Cocciniglia bianca (*Pseudaulacaspis pentagona*)

Non presente . Spazzolare le branche per rimuovere le incrostazione e mettere allo scoperto i follicoli delle femmine svernanti la soglia di intervento è la presenza

Cancro batterico dell'actinidia (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*)

Non Presente.

Sintomi e danni

Il batterio, che dal 2011 è oggetto di lotta obbligatoria (Decreto 07/02/2011), agisce a livello vascolare e una volta penetrato all'interno dell'ospite è difficile da contrastare.

I sintomi di questa batteriosi vascolare sono i seguenti:

- a) imbrunimento dei fiori e dei boccioli e la loro successiva cascola;
- b) presenza di necrosi fogliari di forma irregolare di color marrone scuro contornate da un alone di colore giallo;
- c) formazione di cancri su tronco e tralci con abbondante produzione di un essudato di colore rosso scuro;
- d) collasso/avvizzimento dei frutti.

Nei casi più gravi si assiste alla morte della pianta in pochi mesi.

La batteriosi quindi può arrecare gravi danni a tutti gli organi vegetativi della pianta con forti ripercussioni economiche, soprattutto in funzione del basso livello qualitativo dei frutti, della minore produzione, nonché della mancata commercializzazione.

Il batterio può essere veicolato da differenti fattori come pioggia, vento, insetti, animali e uomo. Il patogeno penetra nella pianta attraverso stomi, lenticelle e ferite, in particolare quelle causate dall'uomo e dalla grandine.

Misure di prevenzione

- evitare squilibri nutrizionali (difetto/eccesso);
- evitare i sistemi di irrigazione per aspersione;
- assicurare un buon drenaggio ed assenza di ristagni idrici;
- evitare di determinare ferite accidentali (colletto, tronco);
- disinfettare tutti gli utensili impiegati nelle operazioni di potatura con sali di rame, alcool e varechina al passaggio da una pianta all'altra, indipendentemente se si osservano o meno dei sintomi e utilizzare sempre utensili disinfettati nell'effettuare potature di recupero;
- chiudere i tagli di potatura superiori ai 2-3 cm con mastici ecologici miscelati a sali di rame;
- non ammassare e non lasciare i tralci di potatura all'interno o in prossimità dell'impianto;
- impiegare prodotti autorizzati a base di sali di rame secondo le modalità riportate in etichetta, al fine di ridurre la carica batterica e prevenire l'infezione;
- evitare il passaggio di trattori e altri macchinari., da impianti infetti ad altri apparentemente sani.

OLIVO

N°	Comune	UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
01	Vitulazio	Collicella	Di Giacomo Raffaele	Corniola	Inizio fioritura	Non vi sono problemi fitosanitari da evidenziare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleagina*)

Effettuare interventi dopo aver diagnosticato la presenza del parassita col metodo della diagnosi precoce: accogliere a caso da 10 piante distanti tra loro, per ogni ha di oliveto, 200 foglie e immergerle in una soluzione di NaOH o di KOH al 5% per 2-3 minuti, ad una temperatura, per le foglie vecchie, di 50-60° C, di 20-30°C per quelle giovani. Quindi, esaminate le foglie; su quelle infette si evidenzieranno macchiette scure rotondeggianti. Questa diagnosi va effettuata al risveglio vegetativo ed a inizio autunno con frequenza quindicinale. Soglia di intervento: 30-40% di foglie infette.

AGRUMI

N°	Comune	UTM		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
01	Capua	Via Martiri di Nassirya	Pasquariello Giovanni	Varie	Bottoni fioritura	Non vi sono problemi fitosanitari da segnalare.



Bottoni fiorali

Cocciniglie

Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*); **Cocciniglia piatta e C. marezzata degli agrumi** (*Coccus hesperidum e C.pseudomagnoliarum*); **Cocciniglia elmetto** (*Ceroplastes sinensis*)

Campionamento: ad inizio settembre prelevare 4 rametti di 10 cm per pianta sul 5-10% delle piante, per un totale di almeno 100 rametti.

Controllo Chimico:

La soglia di intervento è pari a 1 femmina per 10 cm di rametto o a 3-4 neanidi per foglia. Nel caso di infestazioni in atto nel periodo primaverile, il intervento va effettuato tra fine luglio ed inizio agosto, quando il 90-95% delle femmine presenta uova schiuse, o ad inizio settembre nel caso della Cocciniglia elmetto.

Mal Secco (*Phoma tracheiphila*)

Evitare le lavorazioni al terreno da metà autunno a primavera avanzata. Eseguire le operazioni di potatura preferibilmente nella tarda primavera e con l'occasione eliminare i polloni che si sviluppano al disotto del punto d'innesto. Non eccedere nelle concimazioni azotate.

Afide verde degli agrumi (*Aphis citricola*) **Afide bruno degli agrumi** (*Toxoptera aurantii*) **Afide delle malvacee e delle cucurbitacee** (*Aphis gossypii*)

Alla ripresa vegetativa si valuta la percentuale di infestazione su almeno 100 germogli prelevati dal 10% delle piante. Soglia di intervento: 10% (5% per clementine e mandarino) dei germogli infestati per l'afide verde; 25% per gli altri due afidi.

POMODORO in serra

		UTM 1		Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N°	Comune	Località	Azienda			
01	Francelise	Frappera	Russo Maria Grazia	Maraschina	Accrescimento vegetativo	Buono

AVVISI E NOTIZIE UTILI

Con il D. Lgs n. 150/2012 è stata recepita la succitata direttiva e successivamente sono state emanate le disposizioni operative con DM 22/01/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) (in GU n. 35 del 12/02/2014). Tra le diverse azioni previste dal

PAN rivestono particolare importanza quelle relative alla formazione dell'utilizzatore delle irroratrici, al controllo funzionale delle irroratrici in uso, alla regolazione manutenzione delle stesse. Le norme prevedono che le macchine irroratrici devono essere sottoposte a controlli obbligatori, presso i centri autorizzati con le seguenti scadenze:

L'intervallo dei controlli non deve superare i cinque anni fino al 31/12/2020, successivamente non deve superare i tre anni.

Le attrezzature nuove devono essere sottoposte a controllo entro 5 anni dalla data di acquisto. Le attrezzature impiegate per attività in conto terzi devono essere ricontrollate periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni. Il testo del Decreto è consultabile al seguente link:

<http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/taratura.htm>

- l'elenco dei centri riconosciuti all'attività di controllo delle macchine irroratrici per la protezione delle colture operanti in Regione Campania è consultabile sul sito internet della Regione Campania al seguente link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/taratura_albo.html.

- Si comunica che sul BURC n. 21 del 8 marzo 2021 e sul n. 83 del 03/05/2021 sono stati pubblicate le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle colture – Aggiornamento marzo 2021" disponibili sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html>. Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture

Si informano gli interessati:

Che dal 17/09/2018 è disponibile l'App "Servizio Fitosanitario Campania" si può prenderne visione sul sito internet della Regione Campania al seguente link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_16-05-18.html

- Che sulla G.U. n.88 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il DM n.33 del 22 gennaio 2018 "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali". Gli utilizzatori non professionali sono persone che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

Gli avvisi di cui sopra sono consultabili sul sito internet della Regione Campania;

- che dal 14/12/2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento fitosanitario, è una revisione approfondita della legislazione fitosanitaria dell'UE in vigore dal 1977 con la Direttiva n. 93 ed abroga e sostituisce diverse direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sugli organismi nocivi. Si invitano gli agricoltori interessati a prenderne visione sul sito internet della Regione Campania;

- con il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, la Conversione in legge, sono stati ridefiniti i termini di scadenza degli atti amministrativi. In particolare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni, ai sensi degli articoli 8 (Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente) e 9 (Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, **è prorogata di dodici mesi** e comunque almeno fino al **novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

visione sul sito internet della Regione Campania al seguente link:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_07-04-21B.html.

Deroghe

Deroga territoriale per l'uso della s.a. **Bifenox su pomodoro in pieno campo** per il controllo dell'infestate *Solanum nigrum* (Erba morella) per i tempi e secondo le modalità previste dal DM medesimo (**dal 18/03/2021 al 17/07/2021**) per al massimo un trattamento annuo in pre-trapianto. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

Deroga territoriale per l'uso della sostanza attiva **Propizamide per il diserbo di baby leaf di lattuga, cicorino e valenariella** **Valida per 120 giorni dal 13 Aprile al 10 Agosto 2021**. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Deroga territoriale per l'utilizzo delle s.a. **cyprodinil e fludioxonil per il controllo della muffa grigia (Botrytis cinerea) su actinidia**. **Valida dal 16 Aprile al 12 Agosto 2021**. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Deroga territoriale per l'utilizzo delle s.a. **acetamiprid per il controllo di Cimice asiatica (H. halys) su nocciolo**. **Valida per 120 giorni dal 14 Aprile al 11 Agosto 2021**. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

EVENTUALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL NUMERO VERDE 800.80.10.17 o all'Ufficio di Santa Maria CV del STP-UOD 12/CE ai numeri [0823/1876512](tel:08231876512) e [0823/1876513](tel:08231876513) Fax [0823/1876599](tel:08231876599).

[Il presente Bollettino è stato redatto a cura del Per. Agr. Luigi Ferrante del Servizio Territoriale Provinciale - Unità Operativa Dirigenziale 12 di Caserta Ufficio di Santa Maria Capua Vetere c/o Centro Regionale Ettore Majorana via Caserta Trav. Ex INAPLI Santa Maria Capua Vetere \(CE\) e-Mail: \[bollettinofitosmcv@gmail.com\]\(mailto:bollettinofitosmcv@gmail.com\)](#)

Il prossimo bollettino sarà disponibile il 26/05/2021