



LIBRO GENEALOGICO RAZZE AUTOCTONE

Originaria dei monti Lattari nella zona di Agerola, penisola sorrentina in provincia di Napoli. È una razza a duplice attitudine che deriva da una popolazione locale risalente addirittura al III° secolo e che ha subito poi vari meticciamenti, stabilizzandosi nella razza attuale negli anni '50.

Si tratta di una razza di taglia media, resa unica da secoli di selezione in un ambiente avverso, privo di pascoli, e per lo più tenuta in ricoveri di fortuna.

Questi fattori hanno permesso alla razza di acquisire doti di rusticità e resistenza tali da sopperire alla scarsa disponibilità alimentare, producendo una discreta quantità di latte dalle eccellenti qualità organolettiche.

Questa razza oggi viene utilizzata quasi esclusivamente per la produzione del latte il cui impiego è rivolto alla caseificazione ed in particolare alla produzione del formaggio "Provolone del Monaco D.O.P", caciocavallo, burro e fiordilatte.





STANDARD RAZZA AGEROLESE

AGEROLESE

AREA DI ORIGINE: Regione Campania

ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)

CARATTERI TIPICI:

Taglia: media con tronco abbastanza armonioso.

Mantello e pigmentazione: *pelle* elastica, cute perianale e perivulvare di colore carnicino, giallo paglierino tendente al rosa, rima vulvare e apertura anale nerastre.

vacche - colore bruno con tonalità più chiara nella regione addominale; riga dorso lombare più chiara del colorito del mantello; **tori** - nero maltinto con riga dorso lombare chiara.

Testa: leggera, breve, sincipite leggermente convesso con depressione centrale poco marcata, *ciuffo* al sincipite dello stesso colore del mantello; *profilo* concavo

nella regione frontale; *occhi* grandi vivi con i margini palpebrali dello stesso colore del mantello; *orecchie* di media grandezza con folti peli chiari nell'interno e sul bordo del padiglione auricolare; *musello* nero contornato da alone bianco spesso incompleto; *lingua* di colore ardesia con nodo carnicino; *corna* leggere di media lunghezza, incurvate nei tori, dirette di lato, in alto e in avanti nelle vacche.

Anteriore: *collo* leggero con giogaia ridotta; *garrese* non rilevato né aperto; *spalle* ben aderenti al tronco; *torace* ampio e profondo; *arti* proporzionati e poco muscolosi, *articolazioni* bene sviluppate e asciutte, *appiombi* regolari; *piedi* forti e ben serrati, con unghielli neri.

Linea dorsale: rettilinea, *lombi* di buona conformazione.

Groppa: dritta; *coda* con attacco alto e sottile con fusto fino ai garretti con fiocco abbondante di colore nero.

Arti posteriori: appiombi regolari; *cosce* muscolose; *garretti* asciutti; *piedi* corretti con unghielli come negli anteriori; *pastoie* corte e forti.

Caratteri sessuali: **tori** - *scroto* di colore carnicino; *pisciolare* di colore nero; **vacche** - *mammella* ben sviluppata; *quarti* bene evidenti conformati a fiasco; *capezzoli* grossi e lunghi; *vene perimammarie* bene evidenti; *vene sottocutanee addominali* assai sviluppate.

Difetti morfologici: macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali; assenza della riga mulina; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.

Difetti che comportano l'inibizione alla riproduzione:

- ☐ macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali;
- ☐ assenza della riga mulina;
- ☐ mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.