



## Assessorato Agricoltura

“DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UOD Fitosanitario regionale-UOD Servizio territoriale provinciale di Salerno”

### **BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE SELE/TANAGRO** (Comuni di Pontecagnano, Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Altavilla, Albanella, Serre, Postiglione, Controne, Sicignano degli Alburni, Buccino, Campagna, Colliano, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, San Gregorio Magno e Valva)

*Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante*  
N. 27 del 21/08/2024

### Andamento meteorologico

**Andamento meteorologico dal 12/08/2024 al 18/08/2024** I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito [http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo\\_2024.html](http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2024.html)

### Stato fitosanitario delle colture

#### **COLTURA: PESCO**

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
<b>01</b>	<b>Eboli</b>	<b>Piano Dell'Ospedale</b>	<b>Platy Belle</b>	<b>Raccolta</b>	<b>Nulla da segnalare</b>

#### CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA.

In questa fase fenologica si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di:

**1) Mosca mediterranea della frutta** (*Ceratitis capitata*). Installare trappole cromotropiche gialle poco prima dell'invasatura.

Chimico: Intervenire alle prime catture e punture fertili. *Beauveria bassiana* Dispositivi "Attract and kill" attivati con deltametrina o **Lambdacialotrina** Esca proteica a base di proteine idrolizzate **Lambdacialotrina** (1)(4) **Etofenprox** (2)(4) Acetamiprid (3) Spinosad(5)

(1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

(2) Al massimo 1 intervento annuo indipendentemente dal fitofago.

(3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

- (4) Tra piretroidi e **Etofenprox** al massimo 4 interventi all'anno.  
 (5) Esche pronte all'uso.



**COLTURA: OLIVO**

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
<b>01</b>	<b>Campagna</b>	<b>Santa Maria la Nova</b>	<b>Rotondella-Carpellese</b>	<b>Accrescimento dei frutticini</b>	<b>Nulla da segnalare</b>

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

In questa fase fenologica si consiglia di monitorare la presenza di:

**Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)** - Campionamento: valutare settimanalmente dalla fase di ingrossamento frutti la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 frutti a caso su 10 piante). **Chimico**: nelle olive da olio effettuare interventi:

- preventivi (adulticidi): esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad, acetamiprid o lambda-cialotrina, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale.

- curativi (nei confronti delle larve): al superamento della soglia, intervenire nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).

Soglia di intervento (solo per la generazione carpo-faga su olive da olio): in funzione delle varietà, 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Impiego delle trappole per il monitoraggio degli adulti.

Cattura massale con trappole a feromoni - *Opius concolor* - *Beauveria bassiana* - Esche attrattive

Spinosad (1) Acetamiprid (2) Flupyradifurone ,Cyantraniliprole (3)

(1) Applicazioni con specifica esca pronta all'uso.

(2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.

(3) Applicazioni con specifica esca pronta all'uso.

#### **COLTURA:ACTINIDIA**

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
<b>01</b>	<b>Eboli</b>	<b>Pennatone</b>	<b>Hayward</b>	<b>Ingrossamento frutto</b>	<b>Nulla da segnalare</b>
<b>02</b>	<b>Battipaglia</b>	<b>Porta di Ferro</b>	<b>Hayward</b>	<b>Ingrossamento frutto</b>	<b>Nulla da segnalare</b>

#### CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

In questa fase fenologica si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di: **Cancro batterico** (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

*Agronomico: Effettuare concimazioni equilibrate. Effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma. Effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari. Disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi. Evitare irrigazioni per aspersione. Monitorare frequentemente gli impianti.*

Con **Decreto Dirigenziale n.38 del 13/03/2024** sono state **approvate** le nuove **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (valide per l'anno 2024 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 24 del 18/03/2023. [http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD\\_38-13-03-24-norme-tecniche-2024.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_38-13-03-24-norme-tecniche-2024.pdf)

Si informa che con **Decreto Dirigenziale n.70 del 13/05/2024** sono state modificate ed integrate le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (valide per l'anno 2024 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 39 del 20/05/2023. [http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD\\_70-13-05-24-rettifica-norme-tecniche-2024.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_70-13-05-24-rettifica-norme-tecniche-2024.pdf)

Le Norme costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania per la parte riguardante la difesa ed il diserbo integrato delle colture. A tali Norme Tecniche devono attenersi:

- le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI);
- i beneficiari della Misura 10 "Pagamenti Agro- climatici ambientali"– Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali. Tipologia di intervento 10.1.1 "Produzione integrata" del PSR Campania 2014-2020 in quanto parte integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata per quanto riguarda la parte inerente la difesa e il diserbo integrato delle colture;

- tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture in Campania.

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture.

**(1) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Napropamide** per il diserbo in pre – semina di *broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, Brassica juncea, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, ravanella, rucola, crescione, valerianella e basilico* per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni **Prot. 2024.0134166 del 13/03/2024**

**(2) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Bifenazate** su *fragola* in pieno campo e in serra per il controllo del Ragnetto rosso (*T.urticae*) **Prot. 2024. 0156395 del 26/03/2024**

**(3) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. sulfoxaflor** su *susino, ciliegio, melo e pesco* per il controllo degli afidi **Prot. 2024. 0169985 del 03/04/2024**

**(4) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Metamitron** per il diserbo in pre – emergenza di *bietola da foglia* per il controllo di infestanti dicotiledoni **Prot. 2024.0170020 del 03/04/2024**

**(5) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Cyantraniliprole** su *fragola* in serra per il controllo della *Frankliniella occidentalis* e *Drosophila suzukii* **Prot. 2024. 0203832 del 22/04/2024**

**(6) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Cyantraniliprole** su *pomodoro* in pieno campo per il controllo degli Elateridi (*Agriotes spp*) **Prot. 2024. 0226664 del 07/05/2024**

**(7) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Propizamide** per il diserbo di *baby leaf di lattuga, cicorino, dolcetta* in pieno campo e serra in pre-semina o in post-semina prima dell'emergenza della coltura **Prot. 2024. 0256269 del 23/05/2024**

**(8) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. acetamiprid** per il controllo di Cimice asiatica (*H.halys*) su *nocciolo* **Prot. 2024. 0267658 del 29/05/2024**

**(9) Deroga territoriale** per l'utilizzo della **s.a. Napropamide** per il diserbo in pre-semina di *rucola e dolcetta* per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni **Prot. 2024. 0347862 del 15/07/2024**

**(10) Deroga territoriale** Deroga territoriale per l'autorizzazione di un trattamento fitosanitario aggiuntivo per il controllo del Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*) su *pomodoro* in pieno campo **Prot. 2024. 0382482 del 05/08/2024**



*Azioni di contrasto ad Halyomorpha halys in Campania*

A seguito della prima segnalazione della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) in Campania nel 2016 e dell'incremento della sua popolazione osservato negli anni successivi, il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) della Campania a partire dal 2020 ha istituito una specifica rete regionale di monitoraggio del fitofago invasivo avente come obiettivo lo studio dell'ecologia dell'insetto nel territorio regionale, l'individuazione delle colture agrarie e delle aree suscettibili di danno economico, l'attuazione di azioni di contrasto per ridurre l'incremento demografico e la dannosità della cimice asiatica. Per lo svolgimento di tale attività, il SFR si

avvale del supporto scientifico dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede di Portici (NA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR).

*trappola Shindo (Biogard)*

#### ***Cosa possono fare i cittadini***

La cimice asiatica può danneggiare seriamente la produzione di piante coltivate sia arboree che erbacee. Pertanto, è **importante segnalarne l'eventuale presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Campania**. Ciò allo scopo di consentire una rapida applicazione di misure di controllo per limitarne la diffusione sul territorio. Se pensi di avere individuato la presenza della cimice asiatica:

-possibilmente, raccogli e conserva in un barattolo qualche esemplare oppure scatta qualche fotografia;

-annota la località o registra la posizione sul tuo smartphone e la pianta sulla quale hai osservato l'insetto;

**Contatti** [servizio.fitosanitario@regione.campania.it](mailto:servizio.fitosanitario@regione.campania.it)

---

**E' possibile, altresì, consultare tutte le deroghe territoriali, sul sito della Regione Campania – Assessorato Agricoltura – Servizio Fitosanitario Regionale <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html> , Sezione Deroghe Territoriali**

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico: Vincenzo Sica della **UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**” Ufficio di Battipaglia Via Belvedere, 4 - tel 0828/670720.

e-mail: [cesa.eboli@regione.campania.it](mailto:cesa.eboli@regione.campania.it)

Il prossimo bollettino sarà disponibile il **28/08/2024**