



## Assessorato Agricoltura

*“DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI*

*UOD Fitosanitario regionale-UOD Servizio territoriale provinciale di Salerno”*

### **BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE SELE/TANAGRO**

(Comuni di Pontecagnano, Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Altavilla, Albanella, Serre, Postiglione, Controne, Sicignano degli Alburni, Buccino, Campagna, Colliano, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, San Gregorio Magno e Valva)

*Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante*  
N. 05 del 19/03/2025

### Andamento meteorologico

**Andamento meteorologico dal 10/03/2025 al 16/03/2025** I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito [http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo\\_2025.html](http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2025.html)

### Stato fitosanitario delle colture

#### **COLTURA: PESCO**

| N°        | COMUNE       | UTM            | Varietà            | Stadio fenologico     | Stato Fitosanitario       |
|-----------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
|           |              | Località       |                    |                       |                           |
| <b>01</b> | <b>Eboli</b> | <b>Fiocche</b> | <b>Platy Belle</b> | <b>Fine Fioritura</b> | <b>Nulla da segnalare</b> |

#### CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA.

Si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di: **Bolla o Accartocciamento fogliare** (*Taphrina deformans*) Nei pescheti con un basso livello di rischio di infezione, un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie ed un secondo a fine inverno o posticipato nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa.

Negli impianti colpiti l'anno precedente in forma grave o in caso di andamento meteorologico freddo e piovoso effettuare un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie, un secondo verso fine inverno ed un terzo nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa. Ziram (1)(7); Dodina(3); Difenconazolo (2)(4); Tebuconazolo + zolfo (2)(5); Prodotti rameici (6); Captano (7)

- 1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo interventi al bruno.
- (2) Con gli IBE al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
- (3) Al massimo 2 interventi all'anno.
- (4) Il difenoconazolo non può essere complessivamente usato più di 2 volte all'anno.
- (5) Il tebuconazolo non può essere complessivamente usato più di 2 volte all'anno..
- (6) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
- (7) Tra Ziram e Captano al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo interventi al bruno.

Non effettuare trattamenti



#### **COLTURA: OLIVO**

| N°        | COMUNE          | UTM                        | Varietà                      | Stadio fenologico        | Stato Fitosanitario       |
|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|           |                 | Località                   |                              |                          |                           |
| <b>01</b> | <b>Campagna</b> | <b>Santa Maria la Nova</b> | <b>Rotondella-Carpellese</b> | <b>Riposo Vegetativo</b> | <b>Nulla da segnalare</b> |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

#### **COLTURA: ACTINIDIA**

| N°        | COMUNE             | UTM                   | Varietà        | Stadio fenologico        | Stato Fitosanitario       |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
|           |                    | Località              |                |                          |                           |
| <b>01</b> | <b>Eboli</b>       | <b>Pennatone</b>      | <b>Hayward</b> | <b>Riposo Vegetativo</b> | <b>Nulla da segnalare</b> |
| <b>02</b> | <b>Battipaglia</b> | <b>Porta di Ferro</b> | <b>Hayward</b> | <b>Riposo Vegetativo</b> | <b>Nulla da segnalare</b> |

## CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA



Con **Decreto Dirigenziale n.38 del 13/03/2024** sono state **approvate** le nuove **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (*valide per l'anno 2024 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 24 del 18/03/2023.* [http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD\\_38-13-03-24-norme-tecniche-2024.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_38-13-03-24-norme-tecniche-2024.pdf)

Si informa che con **Decreto Dirigenziale n.70 del 13/05/2024** sono state modificate ed integrate le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (*valide per l'anno 2024 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 39 del 20/05/2023.* [http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD\\_70-13-05-24-rettifica-norme-tecniche-2024.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_70-13-05-24-rettifica-norme-tecniche-2024.pdf)

Le Norme costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania per la parte riguardante la difesa ed il diserbo integrato delle colture. A tali Norme Tecniche devono attenersi:

- le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI);
- i beneficiari della Misura 10 "Pagamenti Agro- climatici ambientali"– Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali. Tipologia di intervento 10.1.1 "Produzione integrata" del PSR Campania 2014-2020 in quanto parte integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata per quanto riguarda la parte inerente la difesa e il diserbo integrato delle colture;
- tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture in Campania.

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture.



### ***Azioni di contrasto ad Halyomorpha halys in Campania***

A seguito della prima segnalazione della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) in Campania nel 2016 e dell'incremento della sua popolazione osservato negli anni successivi, il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) della Campania a partire dal 2020 ha istituito una specifica rete regionale di monitoraggio del fitofago invasivo avente come obiettivo lo studio dell'ecologia dell'insetto nel territorio regionale, l'individuazione delle colture agrarie e delle aree suscettibili di danno economico, l'attuazione di azioni di contrasto per ridurre l'incremento demografico e la dannosità della cimice asiatica. Per lo svolgimento di tale attività, il SFR si avvale del supporto scientifico dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede di Portici (NA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR).

*trappola Shindo (Biogard)*

#### ***Cosa possono fare i cittadini***

La cimice asiatica può danneggiare seriamente la produzione di piante coltivate sia arboree che erbacee. Pertanto, è **importante segnalarne l'eventuale presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Campania**. Ciò allo scopo di consentire una rapida applicazione di misure di controllo per limitarne la diffusione sul territorio. Se pensi di avere individuato la presenza della cimice asiatica:

- possibilmente, raccogli e conserva in un barattolo qualche esemplare oppure scatta qualche fotografia;
- annota la località o registra la posizione sul tuo smartphone e la pianta sulla quale hai osservato l'insetto;

**Contatti** [servizio.fitosanitario@regione.campania.it](mailto:servizio.fitosanitario@regione.campania.it)

**1 Deroga territoriale per l'utilizzo della s.a. Napropamide per il diserbo in presemina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, Brassica juncea, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, rucola, crescione, valerianella per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni **Prot. PG/2025/0103257 del 27/02/2025****

**E' possibile, altresì, consultare tutte le deroghe territoriali , sul sito della **Regione Campania** – **Assessorato Agricoltura** – **Servizio Fitosanitario Regionale** <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html> , Sezione Dergoghe Territoriali**

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico: Vincenzo Sica della **UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**” Ufficio di Battipaglia Via Belvedere, 4 - tel 0828/670720.

e-mail: [cesa.eboli@regione.campania.it](mailto:cesa.eboli@regione.campania.it)

Il prossimo bollettino sarà disponibile il **26/03/2025**