



Assessorato Agricoltura

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI


UFFICIO CENTRALE FITOSANITARIO - AGRICOLTURA URBANA E COSTIERA - NAPOLI

BOLLETTINO FITOSANITARIO TERRITORIALE DI NAPOLI

relativo agli areali: Giuglianese – Flegreo – Piana Campana – Vesuviano – Nolano

Colline Viscianesi – Monti Lattari – Penisola Sorrentina

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture



Edizione del 16 aprile 2025

Andamento meteorologico:

Per la consultazione delle condizioni climatiche trascorse, si rimanda al seguente indirizzo web: https://agricoltura.regionecampania.it/meteo/meteo_2025.html dove si potranno visualizzare per la provincia napoletana le stazioni meteo ubicate ad Acerra, Barano d'Ischia, Boscorecace, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Bel Sito e Saviano.

Inoltre per eventuali altri siti di osservazione, i cui dati pluvio-termometrici sono rilevati dai sensori del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile, sono riportati sul sito internet: <http://centrofunzionale.regionecampania.it/#/pages/dashboard>

Di seguito la rete di monitoraggio delle avversità parassitarie, come approvato da DRD della Regione Campania n°120 del 3 marzo 2025.

STATO FITOSANITARIO DELLE COLTURE

Noce

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilevi fitosanitari
ROCCARAINOLA	Risignano	<i>Sorrento</i>	infiorescenze	nulla da segnalare
SAN VITALIANO	Calcara	<i>Malizia</i>	infiorescenze	nulla da segnalare
LIVERI	Mesola	<i>Tulare</i>	infiorescenze	nulla da segnalare
MARIGLIANO	Sentino	<i>Chandler</i>	infiorescenze	nulla da segnalare



Nocciolo

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
NOLA	Martiniello	<i>Mortarella</i>	infiorescenze	presenza di eriofide
CASAMARCIANO	Starza	<i>Tonda di Giffoni</i>	infiorescenze	nulla da segnalare



Olivo da olio

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
SANT'AGNELLO	Trasaelle	<i>Minucciola</i>	germogliamento	nulla da segnalare
NAPOLI	c.so V. Emanuele	<i>Leccino</i>	germogliamento	presenza di occhio di pavone
PIANO DI SORRENTO	dei Platani	<i>Leccino</i>	germogliamento	presenza di occhio di pavone



Ciliegio

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
CALVIZZANO	Viale della resistenza	<i>della Recca</i>	fioritura	nulla da segnalare



Pesco

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
GIUGLIANO	Via Salice	<i>polpa gialla</i>	fioritura	nessun rilievo
QUALIANO	pozzo nuovo	<i>Nettarina (Big Bang)</i>	fioritura	nessun rilievo



Melo

Comune	Località	Varietà	Stadio fenologico	rilevi fitosanitari
GIUGLIANO	Via Salice	<i>Annurca</i>	punte verdi	presenza di asfissia radicale



Vite da vino


Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilevi fitosanitari
NAPOLI	c.so V. Emanuele	<i>Falanghina</i>	<i>gemma cotonosa</i>	nulla da segnalare

BACOLI	Villa di Cesare	<i>Piedirocco</i>	<i>gemma cotonosa</i>	nulla da segnalare
BACOLI	Piscina Mirabile	<i>Falanghina</i>	<i>gemma cotonosa</i>	nulla da segnalare



Limone

Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
PIANO DI SORRENTO	dei Platani	<i>Ovale di Sorrento</i>	maturazione frutti	nulla da segnalare



Fragola				
Comune	Località	Varietà	Stadio Fenologico	rilievi fitosanitari
GIUGLIANO	Scafarea	<i>Sabrina</i>	raccolta	nulla da segnalare



CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halys*)




Costante è il monitoraggio del fitofago *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) ampiamente presente nell'area Nolana, ove si registrano decine di catture nei corileti.

Per una rete di osservazione più capillare ci si avvale del supporto scientifico dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR), con siti di osservazione distribuiti in tutta la regione e ubicati in prossimità di colture agrarie suscettibili agli attacchi di *Halyomorpha h.* Di seguito la prima a sx trappola Shindo e centrale a tubo utilizzate dal Centro Ricerche. Mentre a dx la trappola fornita dal S.F. della Regione Campania.



Per la provincia di Napoli 4 sono i siti: Cimitile, San Vitaliano, San Paolo Bel Sito e Visciano.

MOSCA ORIENTALE (*Bactrocera dorsalis*)



A seguito dell'attività di monitoraggio iniziata lo scorso anno, svolta con l'uso di trappole (come WING e McPhail, tutte attivate con Methyl- eugenolo) in numero di 3.716, nell'ambito del progetto URCoFi (CNR Portici – Regione Campania Servizio itosanitario) nel corso del 2024 fino a tutto settembre sono stati ritrovati solo **2 individui** (1 a giugno e l'altro a settembre), successivamente le catture sono progressivamente aumentate, anche se in misura inferiore rispetto allo scorso anno, con uno spostamento dell'area delle catture verso il comune di **San Gennaro Vesuviano**. Il totale delle catture ad oggi è pari a **87 adulti (tutti maschi)**.

Durante i mesi estivi sono stati prelevati circa 300 campioni di frutti di specie diverse (kaki, pesche, limoni, clementine e arance). Ma solo a novembre dello scorso anno, alcuni frutti di **kaki** presentavano pupari, da cui è sfarfallato 1 solo adulto di *B. dorsalis*.



Si ricorda che, per l'anno in corso, sono valide le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture - versione marzo 2025** - con D.R.D. n.35 del 27-03-2025 (<https://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/disciplinari-2025.pdf>), redatte sul B.U.R.C. n.21 del 07-04-2025



CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA per il controllo della Peronospora della vite:

Nell'ordinanza MASAF n. 7/2024 art. 5 è previsto che per le imprese **viticole** che operano in regime **biologico**, di cui al Regolamento (UE) 2018/848, l'utilizzo delle sostanze attive che sono riportate nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021.



Si avvisa che le **macchine irroratrici** devono essere sottoposte a controlli obbligatori periodicamente presso i centri autorizzati.

Dettagliate info sono reperibili sul sito:

<http://agricoltura.regionecampania.it/difesa/taratura.htm>

DEROGHE TERRITORIALI
emesse dal Servizio Fitosanitario
della Regione Campania



- E' stata autorizzata la s.a. **Napropamide** per il diserbo in presemina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, Brassica juncea, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, rucola, crescione, valerianella, valida dal 19 febbraio al **18 giugno 2025** (D.M. 19.02.2025).
- E' stata autorizzata la s.a. **Pyriproxyfen** per il controllo della *Cocciniglia bianca* (Pseudalacaspis pentagona) su actinidia, valida dal 19 febbraio al **18 giugno 2025** (D.M. 19.02.2025).
- E' stata autorizzata la s.a. **Propizamide** per il diserbo di baby leaf di lattuga, cicorino, dolcetta in pieno campo e serra in pre emergenza, valida dal 26 marzo al **23 luglio 2025** (D.M. 26.03.2025).



Disciplinare di Produzione Integrata – Norme tecniche generali e Guida alla Concimazione, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 254 del 20-12-2023. Consultabili sul sito:
http://agricoltura.regionecampania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html