



Assessorato Agricoltura

"DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI"

UOD Fitosanitario regionale-UOD Servizio territoriale provinciale di Salerno"

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE SELENAGRO (Comuni di Pontecagnano, Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Altavilla, Albanella, Serre, Postiglione, Controne, Sicignano degli Alburni, Buccino, Campagna, Colliano, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, San Gregorio Magno e Valva)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante
N. 07 del 02/04/2025

Andamento meteorologico

Andamento meteorologico dal 24/03/2025 al 30/03/2025 I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2025.html

Stato fitosanitario delle colture

COLTURA: PESCO

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
01	Eboli	Fiocche	Platy Belle	Allegagione	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA.

Si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di: **Bolla o Accartocciamento fogliare** (*Taphrina deformans*) Nei peschetti con un basso livello di rischio di infezione, un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie ed un secondo a fine inverno o posticipato nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa.

Negli impianti colpiti l'anno precedente in forma grave o in caso di andamento meteorologico freddo e piovoso effettuare un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie, un secondo verso fine inverno ed un terzo nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa, Ziram (1)(7); Dodina(3); Difenconazolo (2)(4); Tebuconazolo + zolfo (2)(5); Prodotti rameici (6); Captano (7)

- 1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo interventi al bruno.
- (2)Con gli IBE al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
- (3) Al massimo 2 interventi all'anno.
- (4) Il difenoconazolo non può essere complessivamente usato più di 2 volte all'anno.
- (5) Il tebuconazolo non può essere complessivamente usato più di 2 volte all'anno..
- (6) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
- (7) Tra Ziram e Captano al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo interventi al bruno.

Non effettuare trattamenti



COLTURA: OLIVO

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
01	Campagna	Santa Maria la Nova	Rotondella-Carpellese	Ripresa Vegetativa	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

COLTURA: ACTINIDIA

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
01	Eboli	Pennatone	Hayward	Accrescimento germogli	Nulla da segnalare
02	Battipaglia	Porta di Ferro	Hayward	Accrescimento germogli	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA



Con **Decreto Dirigenziale n.38 del 13/03/2024** sono state **approvate** le nuove **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (*valide per l'anno 2024 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 24 del 18/03/2023.* http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_38-13-03-24-norme-tecniche-2024.pdf)

Si informa che con **Decreto Dirigenziale n.70 del 13/05/2024** sono state modificate ed integrate le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (*valide per l'anno 2024 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 39 del 20/05/2023.* http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_70-13-05-24-rettifica-norme-tecniche-2024.pdf)

Le Norme costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania per la parte riguardante la difesa ed il diserbo integrato delle colture. A tali Norme Tecniche devono attenersi:

- le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI);
- i beneficiari della Misura 10 "Pagamenti Agro- climatici ambientali"– Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali. Tipologia di intervento 10.1.1 "Produzione integrata" del PSR Campania 2014-2020 in quanto parte integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata per quanto riguarda la parte inherente la difesa e il diserbo integrato delle colture;
- tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture in Campania.

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse

devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture.



Azioni di contrasto ad *Halyomorpha halys* in Campania

A seguito della prima segnalazione della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) in Campania nel 2016 e dell'incremento della sua popolazione osservato negli anni successivi, il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) della Campania a partire dal 2020 ha istituito una specifica rete regionale di monitoraggio del fitofago invasivo avente come obiettivo lo studio dell'ecologia dell'insetto nel territorio regionale, l'individuazione delle colture agrarie e delle aree suscettibili di danno economico, l'attuazione di azioni di contrasto per ridurre l'incremento demografico e la dannosità della cimice asiatica. Per lo svolgimento di tale attività, il SFR si avvale del supporto scientifico dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – Sede di Portici (NA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSP-CNR).

trappola Shindo (Biogard)

Cosa possono fare i cittadini

La cimice asiatica può danneggiare seriamente la produzione di piante coltivate sia arboree che erbacee. Pertanto, è importante segnalarne l'eventuale presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Campania. Ciò allo scopo di consentire una rapida applicazione di misure di controllo per limitarne la diffusione sul territorio. Se pensi di avere individuato la presenza della cimice asiatica:

- possibilmente, raccogli e conserva in un barattolo qualche esemplare oppure scatta qualche fotografia;
- annota la località o registra la posizione sul tuo smartphone e la pianta sulla quale hai osservato l'insetto;

Contatti servizio.fitosanitario@regione.campania.it

1. Deroga territoriale per l'utilizzo della s.a. **Napropamide** per il diserbo in presemina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, *Brassica juncea*, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, rucola, crescione, valerianella per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni **Prot. PG/2025/0103257 del 27/02/2025**

2. Deroga territoriale per l'utilizzo della s.a. **Pyriproxyfen** per il controllo della Cocciniglia bianca (*Pseudalacaspis pentagona*) su actinidia **Prot. PG/2025/0147655 del 24/03/2025**

E' possibile, altresì, consultare tutte le deroghe territoriali , sul sito della **Regione Campania** – **Assessorato Agricoltura** – **Servizio Fitosanitario Regionale** <http://www.agricoltura.region.campania.it/difesa/disciplinari.html> , Sezione Deroghe Territoriali

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico: Vincenzo Sica della **UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**" Ufficio di Battipaglia Via Belvedere, 4 - tel 0828/670720.

e-mail: cesa.eboli@regione.campania.it

Il prossimo bollettino sarà disponibile il **09/04/2025**