

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 21 Servizio Fitosanitario
U.O.D. 24 Zootecnia e Benessere Animale

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI VAIRANO PATENORA

(Comuni di Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccamontefina, Roccaromana, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture

N. 09 del 16 Aprile 2025

Andamento meteorologico

Nella capannina meteo del comune di **Conca della Campania** nella settimana che va dal 07 al 13 Aprile si è registrata la temperatura massima il giorno 13 Aprile con 20.8°C, mentre la minima si è avuta nel giorno 09 Aprile con 2.8°C. Si sono verificate precipitazioni piovose nei giorni 10 e 12 Aprile con mm 0.2-0.2

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito <http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm>

Stato fitosanitario delle colture

NOCCIOLO

| N | Comune | Località | Azienda | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|----------------------|--------------|---------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Conca della Campania | Pisciariello | | Tonda di Giffoni | Allungamento germogli | Nulla da segnalare |

| N | Comune | Località | Azienda | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------|----------|---------|--------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 2 | Teano | Carrano | | San Giovanni | Allungamento germogli | Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Cancro batterico: (*Pseudomonas avellanae*) Effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate. Nel caso di accertata presenza e andamenti meteo molto piovosi si può intervenire nel periodo compreso tra fine estate e inizio autunno e i successivi trattamenti in funzione dell'andamento meteorologico

Eriofide delle gemme (*Phytophtorus avellanae*): Non si riscontra la presenza di gemme infestate. Alla ripresa vegetativa campionare 4 rami/pianta sul 10% delle piante presenti in un ettaro la soglia di intervento è pari al 15-20% delle gemme infestate

Afidi (*Myzocalliscoryli Corylobium Avellanae*) esaminare in primavera sul 10% delle piante presenti in un ettaro 8 germogli per pianta la soglia di intervento è 20-30 % di germogli infestati

Mal dello stacco (*Cytospora corylicola*): effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate effettuare una idonea sistemazione del terreno, durante la potatura eliminare con il fuoco le parti infette e proteggere con mastici tagli o le ferite profonde

CILIEGIO

| N | Comune | Località | Azienda | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------|-------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 1 | Teano | Passarell e | | Durone di Vignola | Fine caduta petali | Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus Lepidosaphes ulmi*) Eliminare con la potatura i rami infestati la soglia di intervento è pari alla presenza

Aromia bungii. Non presente

Afidi nero: (*Myzus cerasi*) Campionamento esaminare 100 germogli prelevati sul 5-10% delle piante a partire dalla fase di bottoni bianchi. Intervenire al superamento della soglia del, 3% di germogli infestati.

ACTINIDIA

| N | Comune | UTM | Località | Azienda | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Teano | Tre Rii | | | Hayward | Accrescimento germogli | Nulla da segnalare |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Cancro batterico (*Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*); Non Presente, il batterio attacca sia il kiwi giallo che quello verde, nei nuovi impianti va posta particolare attenzione al manifestarsi dei sintomi sospetti:

- 1) imbrunimento dei fiori e dei boccioli e la loro successiva cascola;
- 2) presenza di necrosi fogliari di forma irregolare di color marrone scuro contornate da un alone di colore giallo;
- 3) formazione di cancri su tronco e tralci con abbondante produzione di un essudato di colore rosso scuro;
- 4) collasso/avvizzimento dei frutti; nei casi più gravi si assiste alla morte della pianta in pochi mesi.

Per prevenire il diffondersi della malattia, effettuare concimazioni equilibrate, effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento, disinfeccare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi, evitare sistemi d'irrigazione per aspersione

Cocciniglia bianca delle Drupacee: Non presente- Introduzione nel frutteto di *Encarsia berlesei* mediante rametti con presenza di cocciniglie parassitizzate (metodo del bouquet a fine inverno) spazzolare il fusto e i rami per rimuovere le incrostazioni e mettere allo scoperto i follicoli delle femmine svernanti

Marciume del colletto: Evitare frequenti lavorazioni e lesioni al colletto delle piante, impiegare esclusivamente materiale sano, non posizionare i gocciolatoi vicino al fusto delle piante ed evitare impiantare in terreni dove di recente si sia manifestata la malattia.

PESCO

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|----|--------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|
| N° | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Teano | Casaquinta | | Azurite | Scamiciatura | Nessuna osservazione |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

CASTAGNO

| | | UTM | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|---|--------------|----------|---------|------------|-------------------|----------------------|
| N | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Roccamonfina | Padula | | Napoletana | Riposo vegetativo | Nessuna osservazione |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

OLIVO

| | UTM | | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|-----|---------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| N ° | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Mignano Monte Lungo | Patierno | | Leccino e tonda | Comparsa nuove foglie | Nessuna osservazione |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Rogna:(*Pseudomonas syringae* pv *savastanoi*)

Metodo agronomico:utilizzare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato eseguire la potatura in periodi asciutti,limitando i grossi tagli ed eliminare i rami infetti.

Metodo chimico:dopo la potatura in condizioni ambientali molto umide e nelle zone ove la patologia è molto presente usare composti rameici.

| VITE | | | | | | |
|------|-----------|----------|---------|------------|-------------------|----------------------|
| | UTM | | | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
| N° | Comune | Località | Azienda | | | |
| 1 | Galluccio | 5 pietre | | falanghina | Foglie distese | Nessuna osservazione |

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Deroghe

Si autorizza l'utilizzo della s.a. forchlorfenuron per il contenimento dei sintomi del Cancro batterico dell'actinidia (PSA) secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito

Si autorizza l'utilizzo della s.a. Napropamide per il diserbo in presemina di broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, Brassica juncea, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, rucola, crescione, valerianella per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo deroga **valida dal:19 febbraio al 18 giugno 2025.**

La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Si autorizza l'utilizzo della s.a. Pyriproxyfen per il controllo della Cocciniglia bianca (Pseudalacaspis pentagona) su actinidia secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo **valida dal 19 febbraio al 18 giugno 2025** La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito

Si autorizza l'utilizzo s.a. s.a.propizamide per il diserbo di baby leaf di lattuga, cicorino, dolcetta in pieno campo e serra in pre semina o in post semina prima dell'emergenza della coltura rispettando i tempi e le modalità di utilizzo previsti dal DM medesimo **valida dal 26 marzo 2025 fino al 23 luglio 2025.**

La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Revoche

Si comunica che sul BURC n. 20 del 13 marzo 2023 sono stati pubblicate le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle colture – Aggiornamento per l'anno 2023 approvate con DRD n. 22 del 02/03/2023 disponibili sul Portale dell'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html>.

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE CAMPANIA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE " NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL

DISERBO INTEGRATO DELLE COLTURE, AGGIORNAMENTO MARZO 2023" APPROVATO CON DRD N.22 DEL 02.03.2023,(PUBBLICATO SUL BURC N.20 DEL 13.03.2023) CON ALLEGATO.

Il presente Bollettino è stato redatto a cura dei tecnici: Melenchi Gennaro della U.O.D. 21 Servizio Fitosanitario, dal Dott Agr. Guarino Umberto e Fattore Lorenzo della U.O.D. 24 Zootecnia e Benessere Animale, Areale di Vairano Patenora. Per ricevere il Bollettino Fitosanitario tramite posta elettronica inviare richiesta al seguente indirizzo e-mail: gennaro.melenchi@regione.campania.it

I bollettini fitosanitari hanno cadenza settimanale. Il prossimo sarà disponibile il 23 Aprile 2025