



## Assessorato Agricoltura

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

U.O.D. 21 Servizio Fitosanitario - U.O.D. 24 Zootecnia e Benessere Animale

### BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE AGRO AVERSANO

(Comuni di Aversa, Cesa, Sant'Arpino, Orta di Atella, Succivo, Gricignano, Carinaro, Teverola, Lusciano, Casaluce, Trentola Ducenta, Parete, Casal di Principe, Frignano, San Marcellino, Villa di Briano, San Cipriano d'Aversa, Casapesenna, Villa Literno)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa integrata delle colture

**N 14 del 22.05.2025** Andamento meteorologico

*I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito*

<https://agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm>);

#### Stato fitosanitario delle colture

#### **PESCO**

| N      | UTM         |         | Varietà | Stadio Fenologico | Stato Fitosanitario |
|--------|-------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| Comune | Località    | Azienda |         |                   |                     |
| 1      | Casapesenna | Calitto | Venus   | Frutto giovane    |                     |

#### CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

**Cancro dei rametti** (*Fusicoccum amygdali*) **Seccume rameale** (*Cytospora cincta*, *C. leucostoma*)

Agronomico:

Asportare e bruciare i rami colpiti. Effettuare concimazioni azotate equilibrate. Preferire le irrigazioni sotto chioma. Disinfettare i grossi tagli di potatura. Proteggere adeguatamente i punti di innesto. Sistemare accuratamente il terreno. Scegliere varietà poco suscettibili.

Chimico:

Intervenire solo in caso di accertata presenza delle malattie:

1) Nella fase di bottoni rosa o scamiciatura.

2) Intervenire ad inizio-metà caduta foglie, in concomitanza di periodi umidi e piovosi.

**Marciume radicale** (*Armillariella mellea*)

Agronomico:

Assicurare un accurato sgrondo delle acque dal suolo ed evitare per quanto possibile ferite all'apparato radicale.

**Bolla o accartocciamento fogliare**

(*Taphrina deformans*)

Chimico:

Nei pescheti con un basso livello di rischio di infezione, un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie ed un secondo a fine inverno o posticipato nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa.

**Cidia orientale del pesco** (*Cydia molesta*)

**Anarsia** (*Anarsia lineatella*)

Controllo biologico:

Confusione o disorientamento sessuale all'inizio dei voli. Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di 1° generazione. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali, in particolare su quelli dei venti dominanti, in modo da interessare l'intero frutteto con la nube feromonica. Installare le trappole a ferormoni a fine fioritura

Campionamenti: su 100 germogli – Ha e/o 100 frutti scelti a caso sul 5-10% delle piante, dopo le prime catture degli adulti o in assenza di trappole al verificarsi dei primi attacchi.

Controllo chimico: intervenire con i IGR quando si ha un sensibile aumento nella cattura degli adulti.

Se si impiegano i fosfororganici attenersi alle seguenti soglie: il 3% di infestazione attiva per l'*Anarsia* mentre per la *Cydia* la soglia di intervento è di 1-2% di germogli/frutti infestati.

**Ragnetto rosso dei fruttiferi:** campionamento: esaminare 100 foglie 2- 5 foglie per venti o cinquanta piante.

Lotta chimica

Soglia di intervento: 60% di foglie occupate da forme mobili e con meno del 20% di foglie con acari predatori (Fitoseidi).

**Cimice asiatica** (*Halyomorpha halis*)**Mosca mediterranea della frutta** (*Ceratitis capitata*)**Monilia** (*Monilia laxa*, *Monilia fructicola*)**Oidio o Mal bianco** (*Sphaerotheca pannosa*)**Afide verde** (*Myzus persicae*)**Afide sigaraio** (*Myzus varians*)**Afide bruno** (*Brachycaudus schwartzii*)**Afide nero** (*Brachycaudus persicae*)**Afide farinoso** (*Hyalopterus amygdali*)**Cocciniglia bianca del pesco** (*Pseudaulacaspis pentagona*)**FRAGOLA**

| N      | UTM               |         | Varietà | Stadio Fenologico                                           | Stato Fitosanitario |
|--------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Comune | Località          | Azienda |         |                                                             |                     |
| 1      | Casal di Principe | Girdino | Sabrina | Fioritura –<br>Frutticini –<br>Invaiaitura -<br>Maturazione |                     |
|        |                   |         |         |                                                             |                     |

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA**

**Oidio** (*Sphaerotheca macularis*, - *Oidium fragariae*)

**Marciume del colletto** (*Phytophthora cactorum*)

**Aleirodi** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)

**Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae*)

**Muffa grigia** (f.a. *Botryotinia fuckeliana* - f.c. *Botrytis cinerea*)

**Afidone della fragola** (*Sitobion fragariae*)

**Afide setoloso della fragola** (*Chaetosiphon fragaefolii*)

**Moscerino dei piccoli frutti** (*Drosophila suzukii*)

**Tripide** (*Frankliniella occidentalis*)

**VITE**

| N      | UTM      |          | Varietà  | Stadio Fenologico                        | Stato Fitosanitario |
|--------|----------|----------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| Comune | Località | Azienda  |          |                                          |                     |
| 1      | PARETE   | portella | Asprinio | Grappoli visibili –<br>Grappoli separati |                     |

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA****Peronospora***(Plasmopara viticola)*

Chimico:

Intervenire preventivamente sulla base della previsione delle piogge o prima dello scadere del periodo d'incubazione.

Dalla pre-fioritura all'allegagione anche in assenza di macchie d'olio intervenire cautelativamente con cadenze

in base ai prodotti utilizzati. Successive fasi vegetative. le strategie di controllo sono in relazione alla pressione della malattia e all'andamento climatico

**Oidio** (*Uncinula necator*, *Oidium tuckeri*)**Muffa grigia** (*Botryotinia fuckeliana*, *Botrytis cinerea*)**Scafoideo** (*Scaphoideus titanus*)**Tignola rigata della vite** (*Cryptoblabes gnidiella*)**Tignoletta** (*Lobesia botrana*)**POMODORO**

| N      | UTM           |                     | Varietà | Stadio Fenologico     | Stato Fitosanitario |
|--------|---------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| Comune | Località      | Azienda             |         |                       |                     |
| 1      | Villa Literno | Madonna del Pantano | Vasco   | Acrescimento piantine |                     |

**CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA****Peronospora** (*Phytophthora infestans*)**Oidio** (*Leveillula taurica*)**Muffa grigia** (*Botrytis cinerea*)**Afide rosato** (*Macrosiphum euphorbiae*)**Mosca minatrice** (*Liriomyza trifolii*, *Liriomyza huidobrensis*)**Aleurodidi** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)**Nottue fogliari carpofaghe** (*Helicoverpa armigera*, *Plusia gamma*, *Spodoptera* spp.)**Tignola del pomodoro** (*Tuta absoluta*)

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico agrt. Nicola GIGLIO della U.O.D. 24 Servizio e Benessere Animale di Caserta. È disponibile sul sito: [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)

Il prossimo Bollettino sarà redatto in data 29/05/2025