



- Area di riferimento: NOLANO
- Periodo di riferimento: 10 - 17 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area NOLANA si registra un incremento delle catture degli adulti di *H. halys*, con valori medi di circa 7 individui per trappola, mentre le catture degli stadi giovanili si mantengono contenute, con circa 1,3 individui/trappola. Il dato conferma la progressiva riduzione delle forme giovanili e una maggiore presenza degli adulti verosimilmente riconducibile anche alla crescente sensibilità al feromone di aggregazione. Nel complesso, la pressione dell'insetto nel Nolano si mantiene su livelli relativamente contenuti, coerentemente con quanto storicamente osservato nell'area.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e dei frutti e mediante "frappage" su colture idonee al fine di valutare l'impatto della diffusione dell'insetto nelle colture e definire l'attuazione di una eventuale strategia di difesa in presenza di frutti suscettibili di danno.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: VISCIANO-MANDAMENTO
- Periodo di riferimento: 10 - 17 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area VISCIANO-MANDAMENTO si registra un marcato incremento delle catture degli adulti di *H. halys*, che raggiungono in media 9,6 individui per trappola, mentre gli stadi giovanili restano stabili su valori contenuti (circa 1 individuo/trappola). Il dato conferma il progressivo completamento dello sviluppo della F2 e la crescente risposta degli adulti al feromone di aggregazione. Le condizioni climatiche, più instabili anche in relazione alla maggiore quota altimetrica dell'area stanno influenzando la dinamica della popolazione.

Nel complesso, le catture confermano una pressione significativa dell'insetto, coerente con la storica elevata presenza di *H. halys* nel comprensorio. Si consiglia di monitorare le trappole e focalizzare l'attenzione sulla vegetazione effettuando un campionamento visivo e mediante "frappage" su colture idonee, per valutare la diffusione dell'insetto all'interno della coltura ed intervenire in presenza di frutti suscettibili di danno.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: IRPINIA
- Periodo di riferimento: 10 - 17 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area IRPINA si registra un marcato incremento delle catture degli adulti di *H. halys*, che raggiungono in media 12,6 individui per trappola, mentre gli stadi giovanili si riducono ulteriormente (0,66 individui/trappola). La dinamica conferma il progressivo completamento dello sviluppo della F2 e la crescente prevalenza della componente adulta associato anche alla maggiore risposta al feromone di aggregazione in questa fase stagionale. L'andamento delle catture può essere influenzato dalla persistente instabilità meteorologica delle aree interne.

Si consiglia di proseguire il monitoraggio, integrando i dati delle trappole con osservazioni sulla vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage" su colture idonee, al fine di valutare la presenza e la distribuzione di *H. halys* nell'area monitorata.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: ALTO CASERTANO
- Periodo di riferimento: 3 - 10 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area ALTO CASERTANO si registra un ulteriore incremento delle catture degli adulti di *H. halys*, che raggiungono in media 10,5 individui per trappola coerente con il progressivo completamento della F2, mentre gli stadi giovanili si mantengono su valori contenuti (1,66 individui/trappola). La crescente prevalenza degli adulti è compatibile con la maggiore risposta al feromone di aggregazione. Le condizioni climatiche tendenzialmente più fresche, data la moderata instabilità meteorologica pomeridiana, può aver contribuito a modulare l'andamento delle catture.

Si consiglia di proseguire il monitoraggio, integrando le catture in trappola con osservazioni sulla vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage" su colture idonee, al fine di valutare la presenza e la distribuzione di *H. halys* all'interno delle colture e seguirne l'evoluzione nel corso della stagione.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: TEANESE
- Periodo di riferimento: 3 - 10 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area TEANESE si registra un ulteriore incremento delle catture degli adulti di *H. halys*, che raggiungono in media 10 individui per trappola, mentre gli stadi giovanili diminuiscono a 1,5 individui per trappola. Il dato conferma una pressione significativa dell'insetto e una sempre più netta prevalenza della componente adulta. La riduzione delle neanidi è coerente con il progressivo completamento dello sviluppo della F2, mentre l'aumento degli adulti può essere associato alla crescente risposta al feromone di aggregazione. Permane pertanto una presenza rilevante di *H. halys* nel comprensorio.

Si consiglia di proseguire il monitoraggio delle trappole, integrandolo con osservazioni sulla vegetazione mediante campionamento visivo su colture idonee, al fine di valutare la presenza e la distribuzione di *H. halys* all'interno delle colture e seguirne l'evoluzione nel corso della stagione.


METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: FALCIANO - CARINOLA
- Periodo di riferimento: 10 -17 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area FALCIANO-CARINOLA la situazione si mantiene sostanzialmente stabile, con catture medie di 3,5 adulti e 1,5 stadi giovanili per trappola. La componente adulta resta prevalente, senza evidenziare ulteriori incrementi rispetto alla settimana precedente, mentre si osserva una lieve variazione delle forme giovanili. Nel complesso, i valori confermano una pressione contenuta di *H. halys*, in linea con l'andamento registrato nell'area durante la stagione. Non si evidenziano, allo stato attuale, variazioni significative nella dinamica della popolazione.

Si consiglia di proseguire il monitoraggio delle trappole, integrandolo con osservazioni sulla vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage" su colture idonee, al fine di seguire l'evoluzione della presenza di *H. halys* nell'area.


- METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: TELESINO - TITERNO
- Periodo di riferimento: 10 - 17 agosto
- Individui monitorati: ADULTI




- Individui monitorati: STADI GIOVANILI




Nell'area TELESINO-TITERNO la situazione si mantiene sostanzialmente stabile, con catture medie di 5 adulti e 1 neanide per trappola, valori invariati rispetto alla settimana precedente. La componente adulta resta prevalente, senza evidenziare ulteriori incrementi delle catture. Nel complesso, i dati risultano coerenti con la storica bassa pressione di *H. halys* nel comprensorio. La persistente instabilità meteorologica dell'area può contribuire a modulare la dinamica e l'attività dell'insetto.

Si consiglia di proseguire il monitoraggio delle trappole, integrandolo con osservazioni sulla vegetazione mediante campionamento visivo e "frappage" su colture idonee, al fine di seguire la presenza e la distribuzione di *H. halys* nell'area.


- METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO



- Area di riferimento: GIFFONESE
- Periodo di riferimento: 10 - 17 agosto
- Individui monitorati: ADULTI



- Individui monitorati: STADI GIOVANILI



Nell'area GIFFONESE la situazione si mantiene sostanzialmente stabile, con catture medie di 4,3 adulti e 0,66 neanidi per trappola. Si conferma la netta prevalenza della componente adulta, mentre le forme giovanili risultano in ulteriore diminuzione, coerentemente con il progressivo completamento della F2. Le condizioni climatiche permangono calde ma caratterizzate da una certa instabilità, che può influenzare la dinamica delle catture. Nel complesso, la pressione di *H. halys* resta contenuta, in linea con quanto storicamente osservato nell'area.

Si consiglia di proseguire il monitoraggio delle trappole, integrandolo con osservazioni sulla vegetazione mediante campionamento visivo e "frappe" su colture idonee, al fine di seguire la presenza e la distribuzione di *H. halys* nell'area.

- METEO PREVISTO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 AGOSTO

